

GUÍA DE RECOMENDACIÓN



PROBLEMAS DE SALUD

ÁCIDO ÚRICO/ GOTA
ACNÉ JUVENIL
AGOTAMIENTO
ALZHEIMER
AMNESIA
ANEMIA
ANSIEDAD - DEPRESIÓN
ART. REUMATOIDEA
ARTROSIS
ASMA BRONQUIAL
ALTERACIÓN NERVIOSA
AGOTAMIENTO FÍSICO
CÁLCULOS RENALES
CÁNCER
CIRROSIS HEPÁTICA
COLESTEROL ELEVADO
COLELITIASIS
CRECIMIENTO INFANTIL
CAÍDA DEL CABELLO

DESEQUILIBRIO NERVIOSO
DEFENSAS BAJAS
DIABETES
DISFUNCIÓN ERECTIL
DOLOR y FIEBRE
ESTREÑIMIENTO
ESTRÉS
ESCLERODERMIA
FIBROSIS PULMONAR
GASTRITIS - BACTERIA HP
HEMORROIDES
HEPATITIS
HÍGADO GRASO
HIPERTIROIDISMO
INSOMNIO
INFLAMACIONES
INFECCIÓN VIAS URINARIAS
LUMBALGIA
LEUCEMIA

LUPUS
LIMPIEZA DE COLON
MALA CIRCULACIÓN
MENOPAUSIA
MIGRAÑA
MIOMAS UTERINOS
OSTEOPOROSIS
OV. POLIQUÍSTICOS
PIEL FLÁCIDA
PARKINSON
PRE DERRAME
PRESIÓN ALTA
PROSTATITIS
PSORIASIS
RESFRIOS /GRIPE
SIND. DE COLON IRRITABLE
TRIGLICÉRIDOS ELEVADOS
TOS CRÓNICA
TUMORES BENIGNOS

ÚLCERA GÁSTRICA
VARICES
VEJEZ PREMATURA
VITILIGO
VIRUS DEL PAPILOMA H. (VPH)
VISIÓN BORROSA/CATARATA

IMPORTANTE

La presente guía de recomendaciones de consumo de productos Livinoe está elaborado bajo criterios profesionales y basado en los resultados obtenidos.

Los productos Livinoe son formulados con extractos naturales estandarizados, por lo que tienen efecto regenerativo y nutricional, no presentan ninguna contraindicación ni efecto secundario.

Los productos Livinoe también cumplen la función preventiva y complementaria a la alimentación diaria; para este uso se recomienda consumir la mitad de la cantidad recomendada.

PRODUCTOS

PROBLEMA DE SALUD

PRODUCTO SUGERIDO

Principal/complementario

MODO DE CONSUMO



ÁCIDO ÚRICO/ GOTA

- **INMUNET**
- **NEF**
- **FNC**

1 Caps. una hora antes del desayuno y cena
1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.
1 Cap. al acostarse y levantarse



ACNÉ JUVENIL

- **YOUNG**
- **INMUNET/ EHFEM**
- **FNC**

1 Caps. media hora antes del desayuno.
1 Caps. una hora antes del desayuno.
1 Cap. al acostarse y levantarse



AGOTAMIENTO FÍSICO

- **ENERGY NL**
- **SPIRULINA**

1 ó 2 Caps. después del desayuno.
1 Cap. en cada comida



ALZHEIMER

- **INMUNET**
- **YOUNG**
- **VITAL FSN**

1 Caps. una hora antes del desayuno y cena.
1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.
1 Cap. después del desayuno.



AMNESIA

- **INMUNET**
- **VITAL FSN**
- **YOUNG**

2 Cap. una hora antes del desayuno.
1 Cap. después del desayuno.
1 Cap. media hora antes de desayuno y cena.

ANEMIA

- **SPIRULINA**
- **FNC**
- **INMUNET**

3 Cap. en cada comida.
1 Cap. al levantarse y al acostarse.
1 Caps. una hora antes del desayuno y cena

ANSIEDAD - DEPRESIÓN

- **VITAL FSN**
- **INMUNET**
- **S3**

1 ó 2 Cap. después de desayuno
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena.
2 Caps. una hora antes de dormir.

PRODUCTOS

PROBLEMA DE SALUD

PRODUCTO SUGERIDO

Principal/complementario

MODO DE CONSUMO



ART. REUMATOIDEA

- **FACTOR P53**
- **YOUNG**
- **INMUNET**
- **REVIT HT2**
- **DOLIV**

2 Cap. media hora antes de cada comida.
1 Cap. media hora antes de desayuno y cena
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
1 Cap. después del desayuno y cena
2 Cap. cuando hay dolor

ARTROSIS

- **REVIT HT2**
- **BIOCAL**
- **DOLIV**
- **INMUNET**

2 Cap. después del desayuno y cena.
1 Cap. en cada comida.
2 Caps. cuando hay dolor
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena

ASMA BRONQUIAL

- **FACTOR P53**
- **INMUNET**
- **SPIRULINA**

1 Cap. media hora antes de cada comida.
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
1 Cap. en cada comida

ALTERACIÓN NERVIOSA

- **VITAL FSN**
- **INMUNET**

2 Cap. después del desayuno
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena

ALERGIAS

- **FACTOR P53**
- **SPIRULINA**
- **INMUNET**

1 Cap. antes del desayuno y cena.
1 Cap. en cada comida.
1 Cap. antes del desayuno y cena

CÁLCULOS RENALES/ ARENILLA

- **NEF**
- **FNC**
- **INMUNET**

1 Cap. media hora antes de cada comida.
1 Cap. antes del desayuno
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena

CÁNCER

- **FACTOR P53**
- **INMUNET**
- **YOUNG**
- **SPIRULINA**
- **DOLIV**

3 Cap. media hora antes de cada comida.
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
1 Cap. media hora antes de desayuno y cena.
1 Cap. en cada comida.
2 ó 3 Caps. Cuando hay dolor

PRODUCTOS

PROBLEMA DE SALUD

PRODUCTO SUGERIDO

MODO DE CONSUMO

Principal/complementario



CAÍDA DEL CABELLO

- **YOUNG**
- **INMUNET**
- **HOM+ (SOLO VARONES)**

1 Cap. antes del desayuno y cena
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
2 Cap. después de desayuno



CRECIMIENTO INFANTIL

- **SPIRULINA**
- **FNC**

1 Cap. media hora antes de cada comida.
1 Caps. una hora antes del desayuno



CIRROSIS HEPÁTICA

- **NUCELHE**
- **SPIRULINA**
- **INMUNET**

1 Cap. media hora antes de cada comida.
1 Cap. en cada comida.
1 Cap. antes del desayuno y cena



COLELITIASIS

- **NUCELHE**
- **INMUNET**

1 Cap. media hora antes de cada comida
1 Cap. una hora antes del desayuno



DIABETES

- **RGS**
- **INMUNET**
- **FNC**

1 Cap. media hora antes de cada comida.
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
1 Cap. al acostarse y levantarse

PRODUCTOS

PROBLEMA DE SALUD

PRODUCTO SUGERIDO Principal/complementario

MODO DE CONSUMO



DISFUNCIÓN ERÉCTIL
Impotencia

- **HOM+**
- **FNC**
- **INMUNET**

2 Cap. después del desayuno.
1 Cap. antes del desayuno y cena
1 Cap. una hora antes de desayuno y cena



DOLOR Y FIEBRE

- **DOLIV**
- **INMUNET**

2 Caps. después de cada comida x 10 días
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena



ESTREÑIMIENTO CRÓNICO

- **BPRO**
- **OXY-COLON**
- **S3**
- **VITAL FSN**

2 Caps. después del desayuno.
1 Cap. después de cena.
2 Caps. una hora antes de dormir
1 Cap. después del desayuno

ESTRÉS

- **S3**
- **VITAL FSN**
- **INMUNET**

2 Caps. una hora antes de dormir.
1 Cap. después del desayuno
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena



ESCLEROSIS/ ESCLERODERMIA

- **FACTOR P53**
- **YOUNG**
- **INMUNET**
- **DOLIV**

2 Cap. media hora antes de cada comida.
1 Cap. media hora antes de desayuno y cena.
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena.
2 ó 3 capsulas cuando hay dolor

FIBROSIS PULMONAR

- **INMUNET**
- **CORDYCEPS**
- **YOUNG**

2 Cap. una hora antes del desayuno y cena
1 Cap. media hora antes de cada comida.
1 Cap. media hora antes de desayuno y cena.



GASTRITIS - H. PYLORI

- **G3**
- **NUCELHE**
- **HI-D**

2 ó 3 Caps. una hora después de cada comida.
1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.
2 Sachet al día

PRODUCTOS

PROBLEMA DE SALUD

PRODUCTO SUGERIDO Principal/complementario

MODO DE CONSUMO



HEMORROIDES

- FNC
- INMUNET
- BPRO

1 Cap. al acostarse y levantarse
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
2 Caps. después de desayuno



HEPATITIS

- NUCELHE
- FNC
- INMUNET

1 Cap. media hora antes de cada comida
1 Cap. al acostarse y levantarse.
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena



HÍGADO GRASO

- NUCELHE
- INMUNET

1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.
2 Caps. una hora antes del desayuno.

HIPO/HIPER TIROIDISMO

- FACTOR P53
- YOUNG
- INMUNET

1 Caps. media hora antes de cada comida.
1 Caps. media hora antes de desayuno y cena..
1 Cap. una hora antes de desayuno y cena



INSOMNIO

- S3
- INMUNET

2 Caps. una hora antes de dormir.
1 cap. antes de desayuno y cena

INFLAMACIONES

- DOLIV
- INMUNET

2 Caps. después de cada comida x 10 días
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena



INFECCIÓN DE LAS VIAS URINARIAS

- NEF
- INMUNET
- DOLIV

1 Cap. una hora antes de desayuno y cena
1 Caps. media hora antes de cada comida.
2 Cap. después de cada comida x 10 días

PRODUCTOS

PROBLEMA DE SALUD

PRODUCTO SUGERIDO

Principal/complementario

MODO DE CONSUMO



LUMBALGIA

- **DOLIV**
- **REVIT C**
- **INMUNET**
- **YOUNG**

2 Cap. después de cada comida x 15 días
Una cucharada dosificadora en ayunas
1 Caps. una hora antes del desayuno.
1 Cap. media hora antes de desayuno y cena.

LEUCEMIA

- **FACTOR P53**
- **INMUNET**
- **SPIRULINA**
- **YOUNG**

2 Cap. media hora antes de cada comida.
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
1 Cap. en cada comida.
1 Cap. media hora antes de desayuno y cena.

LUPUS

- **FACTOR P53**
- **INMUNET**
- **DOLIV**
- **YOUNG**

3 Cap. media hora antes de cada comida.
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
2 ó 3 Caps. cuando hay dolor
1 Cap. media hora antes de desayuno y cena

LIMPIEZA DE COLON

- **OXY-COLON**
- **BPRO**
- **HI D**

2 Caps. una hora después de cada comida.
2 caps. después del desayuno
2 Sachet x día

MALA CIRCULACIÓN

- **FNC**
- **NUCELHE**
- **INMUNET**

1 Cap. al levantarse y acostarse
1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena

MENOPAUSIA

- **EHFEM**
- **FNC**

1 Cap. una hora antes del desayuno y cena.
1 Cap. al levantarse y acostarse.

MIGRAÑA

- **DOLIV**
- **VITAL FSN**
- **ENERGY**

2 Caps. después de desayuno.
1 Cap. después de desayuno
1 Caps. después de desayuno.

PRODUCTOS

PROBLEMA DE SALUD

PRODUCTO SUGERIDO Principal/complementario

MODO DE CONSUMO



MIOMAS EN EL ÚTERO

- EHFEM
- FNC
- INMUNET

1 Cap. una hora antes del desayuno y cena.
1 Cap. al levantarse y acostarse.
1 Cap. una hora antes de desayuno y cena



OSTEOPOROSIS

- BIOCAL
- REVIT C
- INMUNET

2 Caps. en cada comida.
10 una cucharada dosificadora en ayunas.
1 Caps. una hora antes del desayuno y cena



OVARIOS POLIQUÍSTICOS

- EHFEM
- DOLIV
- INMUNET

1 Cap. una hora antes del desayuno y cena.
2 Caps. cuando hay dolor.
2 Cap. una hora antes de desayuno y cena



PIEL FLACIDA Y ENVEJECIDA

- REVIT C
- INMUNET
- YOUNG

10 Una cucharada dosificadora en ayunas.
2 Capsula antes de desayuno
! Cap. media hora antes del desayuno y cena.

PARKINSON

- INMUNET
- VITAL FSN
- YOUNG

2 Caps. una hora antes del desayuno y cena.
1 Cap. después de desayuno.
1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.

PRE DERRAME

- VITAL FSN
- INMUNET
- FNC

2 Cap. después del desayuno y cena
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
1 Cap. al levantarse y al acostarse.



PRESIÓN ALTA

- FNC
- INMUNET

1 Cap. al levantarse y al acostarse
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena

PRODUCTOS

PROBLEMA DE SALUD

PRODUCTO SUGERIDO Principal/complementario

MODO DE CONSUMO



**PRÓSTATA CRECIDA
HPB**

- **HOM+**
- **FNC**
- **INMUNET**

**2 Caps. después del desayuno.
1 Cap. al levantarse y al acostarse.
1 Cap. antes de desayuno y cena**



RESFRIOS /GRIPE

- **DOLIV**
- **INMUNET**

**2 Caps. después de cada comida x 7 días.
1 Cap. una hora antes del desayuno y cena**



**SIND. DE COLON
IRRITABLE**

- **S3**
- **INMUNET**
- **BPRO**

**2 Caps. una hora antes de dormir.
1 Caps. una hora antes del desayuno y cena
2 Caps. una hora antes del desayuno.**



TOS CRÓNICA

- **INMUNET**
- **CORDYCEPS**
- **YOUNG**

**2 Caps. una hora antes del desayuno.
1 Cap. media hora antes de cada comida.
1 cap. Media hora antes de desayuno y cena**



**TRIGLICÉRIDOS
ELEVADOS**

- **NUCELHE**
- **FNC**
- **INMUNET**

**1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.
1 Cap. al levantarse y al acostarse.
1 Caps. una hora antes del desayuno y cena**

TUMORES BENIGNOS

- **INMUNET**
- **FACTOR P53**
- **YOUNG**

**1 Cap. una hora antes del desayuno y cena
1 Cap. media hora antes de cada comida.
1 Cap. media hora antes de desayuno y cena.**

PRODUCTOS

PROBLEMA DE SALUD

PRODUCTO SUGERIDO Principal/complementario

MODO DE CONSUMO



ÚLCERA GÁSTRICA

- G3
- NUCELHE
- FNC

1 ó 2 Cap. una hora después de cada comida.
1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.
1 Cap. al levantarse y al acostarse.



VARICES

- FNC
- INMUNET
- SPIRULINA
- YOUNG

1 Cap. al levantarse y al acostarse.
1 Caps. una hora antes del desayuno y cena
1 Cap. en cada comida.
1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.



VEJEZ PREMATURA.

- YOUNG
- SPIRULINA

2 Cap. media hora antes del desayuno.
1 Cap. media hora antes del desayuno y cena.



VITILIGO

- FACTOR P53
- INMUNET
- YOUNG

2 Cap. media hora antes de cada comida.
1 cap. antes del desayuno y cena
1 Cap. al levantarse y acostarse.

VIRUS DEL PAPILOMA H. (VPH)

- FACTOR P53
- YOUNG
- INMUNET

2 Cap. media hora antes de cada comida.
1 Cap. Media hora antes de desayuno y cena
2 Caps. una hora antes del desayuno.



VISIÓN BORROSA Y DEGENERACIÓN MACULAR

- V+
- YOUNG

1 ó 2 Caps. media hora antes del desayuno.
1 Caps. media hora antes del desayuno y cena.

Para todo tratamiento de enfermedades metabólicas, autoinmunes, degenerativas, neurodegenerativas, congénitas y por mutación celular; adicionalmente RECOMENDAR "YOUNG"

RECOMENDACIONES BÁSICAS ALIMENTARIAS DURANTE EL CONSUMO DE PRODUCTOS LIVINOE



QUE NO CONSUMIR	QUE Y CUANTO CONSUMIR	
Carnes rojas	Verduras y hortalizas	Mínimo 3 colores, porción abundante
Carnes tóxicas (Cerdo y mariscos)	Frutas	De una clase por vez
Azúcar, postres y bebidas gaseosas	Cereales y germinados	De toda variedad, porción moderada
Enlatados y conservas	Hongos naturales	De toda variedad porciones pequeñas
Leche y huevos de granjas	Frutos secos	Porciones pequeñas
Harinas refinadas (Pan, fideos, etc.)	Grasas naturales	Porciones pequeñas
Condimentos y productos irritantes	Sal Rosada/Maras	Al gusto
Sal yodada y aceites hidrogenados	Agua	2 Litros x día
Todo producto envasado que contenga conservantes, saborizantes y colorantes sintéticos (alimentos ultra procesados)	Stevia para endulzar	Al gusto